



Información y Instrucciones para El Cierre de los Pacientes

POR FAVOR LEA ESTA INFORMACIÓN CON CUIDADO. LAS INSTRUCCIONES SON DETALLADAS. MANTENERLOS EN UN LUGAR SEGURO PARA QUE PUEDA REVISARLAS POSTERIORMENTE.

Usted está programado para someterse a un procedimiento Venefit Closure. El procedimiento Venefit Closure se llevará a cabo en la oficina, en 1037 Route 46 East, Suite 202, Clifton, NJ 07013.

Por favor llegue 15 minutos antes de su hora de cirugía programada. Esto nos dará tiempo para completar cualquier papeleo necesario y prepararlo para su procedimiento.

No se dará ningún medicamento por vía intravenosa durante el procedimiento. En su lugar, se le dará recetas para 2 medicamentos que ayudarán a controlar la ansiedad y el malestar durante el procedimiento.

Usted necesitará que alguien lo lleve a la oficina el día del procedimiento y lo lleve a casa.

Este paquete incluye lo siguiente:

- Una receta para Valium
- Una receta para una crema anestésica tópica de la piel llamada Emla se transmitirá directamente a su farmacia
- Usted tendrá que tener una alta compresión de 20-30 mmHg muslo de la media del día del procedimiento
- Una cita de seguimiento para un ultrasonido de la pierna se hará unos días después de su procedimiento

Parte de la información general con respecto a su procedimiento:

- Usted no va a tener ninguna vena retirado en el momento del procedimiento de cierre. Los resultados del procedimiento de cierre en el cierre de la vena tratada para evitar que la sangre viaje en la dirección equivocada en su vena.
- Varices residuales se pueden eliminar en el futuro.
- Sólo pinchazos o se hará una pequeña incisión para realizar Venefit Clausura. Con la crema Emla, pastillas Valium y la anestesia local utilizada durante el procedimiento, estará muy cómodo.
- El procedimiento durará aproximadamente 1-2 horas.

Requisitos para el día del procedimiento:

- Usted puede tener comidas ligeras.
- Puede tomar cualquier medicamento esenciales.
- Si usted toma aspirina, no es necesario dejar de tomarla antes del procedimiento.

- Si se encuentra en Plavix, idealmente, debe ser detenido 10 días antes del procedimiento; SIN EMBARGO, USTED DEBE CONSULTAR EL MÉDICO PRESCRIPTOR ANTES DE DETENER PLAVIX.
- Si se encuentra en Coumadin, idealmente, debe ser detenido 5 días antes del procedimiento; Sin embargo, usted debe consultar el médico prescriptor antes de detener Coumadin.
- Tres horas antes del tiempo del procedimiento, se aplica la crema Emla en la pierna que será tratada. Si el procedimiento está en la vena safena mayor (GSV) en el muslo, por favor aplique la crema generosamente desde la pantorrilla hasta la ingle en el medio interior de su pierna. Si el procedimiento se encuentra en la pequeña vena safena (SSV) aplica la crema en la mitad posterior de la pantorrilla, parte posterior de la rodilla y la espalda baja del muslo. Si el procedimiento se encuentra en una vena perforante, aplicarlo desde el interior de su tobillo a la rodilla. Aplicarlo como usted está poniendo protector solar, pero no lo frote completamente. Una vez que está puesto, envuelve la pierna con plástico de comida! Esto lo mantendrá en su lugar y evitar ensuciar su ropa.
- Por favor, use ropa suelta, como pantalones de chándal, pantalones deportivos, etc., a la oficina.
- Tome una pastilla de Valium aproximadamente 1 hora antes de su llegada a la oficina.

NO CONDUZCA DESPUÉS DE TOMAR VALIUM

- Por favor traiga su pastilla adicional de Valium y media de compresión a la oficina.

Al llegar a la oficina, si usted no se siente lo suficientemente sedado, usted puede tomar una segunda dosis de la Valium.

Después de su tratamiento:

- Al finalizar el procedimiento, una venda y su media de compresión se aplicarán a la pierna. Se le pedirá a caminar.
- Puede salir cuando te sientas cómodo. Usted no debería tener que pasar más de 15 minutos en la oficina después de la finalización del procedimiento.
- Su actividad debe ser mínima en el día del procedimiento. Usted debe descansar con la pierna elevada vez en cuando durante el día. Períodos cortos de deambulación están bien para moverse por la casa y hacer las actividades básicas diarias. No caminar o estar de pie por largos períodos de tiempo.
- Duerma con la compresión de la media durante 2 noches.
- En los 2 días siguientes a su procedimiento, usted puede sacar a su media, vendaje y ducharse. La media debe ser reemplazado siguiente de ducharse.
- Usted puede reanudar sus actividades diarias normales el día después de su procedimiento. Evite el ejercicio pesado o aeróbico durante dos semanas después de su procedimiento.
- Es necesario que lleve su media de compresión para las próximas 2 semanas todos los días después de despertar a cuando vas a la cama. El uso de la media reducirá la probabilidad de desarrollar flebitis y el dolor.
- Cualquier molestia debe ser capaz de gestionar con Tylenol, Aleve o Advil.
- Es necesario tener un ultrasonido unos días después del procedimiento. **Esto es extremadamente importante.**
- **Si presenta dolor, hinchazón de la pierna, enrojecimiento de la piel, ampollas en la piel, fiebre o cualquier otro síntoma que sientes es fuera de lo común, por favor llame y pida hablar con el Dr. Nackman.**